

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PANATUS SIRUP 4 mg/5 ml butamirat

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za vas.

Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi vam koristio na najbolji način.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 5-7 dana, posavjetujte se s ljekarom.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Panatus i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Panatus
3. Kako uzimati Panatus?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Panatus?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE PANATUS I ZA ŠTA SE KORISTI?

Panatus je lijek za simptomatsko liječenje kašla, odnosno smirivanje nadražajnog kašla (antitusik) sa centralnim djelovanjem.

Sprječava neproduktivni i nadražajni kašalj, smanjuje napetost mišića bronha, a istovremeno potpomaže iskašljavanje, olakšava disanje i ublažava bolove u prsima. Tako povoljno utiče na povećanje kapaciteta disanja i na koncentracije plinova u krvi. Hemski i po farmakološkim učincima Panatus se razlikuje od opioidnih antitusika te ne uzrokuje ovisnost. Također, lijek je pogodan za djecu i dijabetičare.

Panatus sirup se preporučuje za simptomatsko liječenje nadražajnog suhog kašla koji nastaje uslijed bilo kojeg izvora.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI PANATUS

Nemojte uzimati Panatus

- ako ste alergični (preosjetljivi) na butamirat citrat ili bilo koji drugi sastojak lijeka Panatus.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da koristite Panatus:

- ako imate teško oštećenje bubrega.

Ako ste počeli uzimati lijek bez savjetovanja s ljekarom i ako ne prestanete kašljati nakon 5 do 7 dana liječenja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Izbjegavajte istovremenu primjenu s ekspektoransima (lijekovi protiv kašla koji olakšavaju uklanjanje sluzi) (vidjeti odjeljak "Drugi lijekovi i Panatus").

Djeca

Sigurnost i efikasnost lijeka Panatus sirup kod djece mlađe od 6 mjeseci još nisu dovoljno istraženi, stoga se ne daje lijek djeci te dobi.

Uzimanje drugih lijekova sa PANATUSOM

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Butamirat citrat, djelatna tvar u Panatusu, inhibira refleks kašla. Stoga treba izbjegavati istovremenu primjenu s ekspektoransima (lijekovi koji se koriste za lakše iskašljavanje sluzi kod produktivnog kašla) jer to može dovesti do nakupljanja sluzi i povećanog rizika od bronhospazma (suženja bronha) i infekcije dišnog sistema..

Uzimanje hrane i pića sa PANATUSOM

Panatus sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela. Tokom liječenja Panatusom nemojte piti alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da dobijete dijete, pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije uzimanja ovog lijeka. Iako nema podataka o negativnim efektima, lijek se ne preporučuje u prva tri mjeseca trudnoće. Može se uzimati kasnije u trudnoći samo po savjetu ljekara. Takođe ne postoje adekvatni podaci o njegovom izlučivanju u majčino mlijeko; stoga se ne preporučuje njegova upotreba tokom dojenja.

Ako zatrudnите tokom liječenja Panatusom, razgovarajte sa svojim ljekarom.

Upravljanje vozilima i mašinama

Panatus može izazvati vrtoglavicu i pospanost. Savjetuje se oprez ako namjeravate voziti ili upravljati mašinama..

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek PANATUS?

Panatus sirup sadrži sorbitol. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, posavjetujte se s njime prije nego što uzmete ovaj lijek.

3. KAKO UZIMATI PANATUS?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Uobičajene dnevne doze prikazane su u tabeli:

Dob	Doza	Frekvencija
Odrasli (i stariji)	6 kašikica za doziranje	Tri do četiri puta dnevno
Djeca starija od 9 godina	3 kašikice za doziranje	Četiri puta dnevno
Djeca od 6 - 9 godina	3 kašikice za doziranje	Tri puta dnevno
Djeca od 3 - 6 godina	2 kašikice za doziranje	Tri puta dnevno
Djeca od 1 - 3 godina	1 kašikica za doziranje	Tri puta dnevno
Dojenčad od 6 mjeseci -1 godine	½ kašikice za doziranje	Četiri puta dnevno

jedna kaškica za doziranje = 5 ml = 4 mg butamirat-citrata

Panatus sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela. Sirup dozirajte priloženom kašikicom, progutajte i isperite tekućinom.

Nemojte prekoračiti preporučene doze kod samoliječenja sa Panatusom. Samoliječenje sa Panatusom može trajati 5-7 dana. Razgovarajte sa svojim ljekarom, ako želite da koristite lijek ili da ga dajte djetetu duži period.

Ukoliko mislite da lijek Panatus slabo ili suviše jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite ljekaru.

Ukoliko ste uzeli lijeka više nego što bi trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli (ili ste ga dali djetetu), odmah se posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom. Pokušajte izazvati povraćanje. U slučaju predoziranja može doći do pospanosti, povraćanja, nekoordiniranih pokreta (ataksija), bolova u trbuhi, proljeva, uznenirenosti i ponešto sniženog krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus

Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Lijek uzimajte (ili dajte djetetu) svaki dan u približno isto vrijeme.

Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se sjetite, ali ako imate samo nekoliko sati do sljedeće doze, preskočite propuštenu dozu i uzmite sljedeću u uobičajeno vreme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se ne moraju javiti kod svih pacijenata koji dobiju ovaj lijek.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 1000 osoba) uključuju osip na koži, urtikarija (koprivnica)probavne smetnje (mučnina, povračanje, proljev), pospanost i vrtoglavicu.

Ni tokom dugotrajnog uzimanja nisu primijećene nuspojave na životne funkcije i rad drugih organa. Posebna prednost lijeka je izostanak nuspojava koji su značajni za opijatne antitusike.

Prijavljivanje sumnje na neželjna dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PANATUS?

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja koji je naveden na kutiji.

Čuvati na temperaturi do 25 °C. Čuvati u originalnom pakovanju kako biste osigurali zaštitu od svjetla. Odmah nakon upotrebe bočicu zatvorite čvrsto.

Držati lijek van dohvarta i pogleda djece!

Rok trajanja Panatus sirupa je 4 godine od datuma proizvodnje.

Panatus se ne smije koristiti poslije isteka roka trajanja lijeka u primjeni.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta PANATUS sirup 4 mg/5 ml sadrži?

Aktivna supstanca: 5 ml sirupa (1 kaškica za doziranje) sadrži 4 mg butamirat-citrata.

Pomoćne supstnace: monohidrat limunske kiseline, sorbitol (nekristalizirajući) (E420), glicerol (E422), saharin-natrij, natrij-benzoat (E211), okus limuna, natrij-hidroksid (E524), pročišćena voda.

Kako PANATUS sirup 4 mg/5 ml izgledaju i sadržaj pakovanja?

Sirup je bistar, bezbojan do žućkasto obojen sirup s okusom limuna.

Kutija s 200 ml sirupa 4 mg/5 ml u staklenoj bočici. U pakovanju je priložena i mjerna kašikica.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

PANATUS sirup, 4 mg/5 ml, 200 ml sirupa: 04-07.3-2-12951/23 od 08.10.2024.

Datum posljednje revizije teksta

08.10.2024.

