

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PANATUS FORTE filmom obložena tableta 50 mg butamirat

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za vas.

Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi vam koristio na najbolji način.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 5-7 dana, posavjetujte se s ljekarom.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Panatus forte i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Panatus forte
3. Kako uzimati Panatus forte?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Panatus forte ?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE PANATUS FORTE I ZA ŠTA SE KORISTI?

Panatus je lijek za simptomatsko liječenje kašlja, odnosno smirivanje nadražajnog kašlja (antitusik) sa centralnim djelovanjem.

Sprječava neproduktivni i nadražajni kašalj, smanjuje napetost mišića bronha, a istovremeno potpomaže iskašljavanje, olakšava disanje i ublažava bolove u prsima. Tako povoljno utiče na povećanje kapaciteta disanja i na koncentracije plinova u krvi. Hemijski i po farmakološkim učincima Panatus forte se razlikuje od opioidnih antitusika te ne uzrokuje ovisnost. Također, lijek je pogodan za djecu i dijabetičare.

Panatus forte tablete se preporučuje za simptomatsko liječenje nadražajnog suhog kašlja koji nastaje uslijed bilo kojeg izvora.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI PANATUS FORTE

Nemojte uzimati Panatus

- ako ste alergični (preosjetljivi) na butamirat citrat ili bilo koji drugi sastojak lijeka Panatus forte.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da koristite Panatus forte:

- ako imate teško oštećenje bubrega.

Ako ste počeli uzimati lijek bez savjetovanja s ljekarom i ako ne prestanete kašljati nakon 5 do 7 dana liječenja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Izbjegavajte istovremenu primjenu s ekspektoransima (lijekovi protiv kašlja koji olakšavaju uklanjanje sluzi) (vidjeti odjeljak "Drugi lijekovi i Panatus"). **Djeca**

Panatus forte 50 mg filmom obložene tablete ne treba davati djeci mlađoj od 12 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa PANATUSOM FORTE

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Butamirat citrat, djelatna tvar u Panatusu, inhibira refleks kašlja. Stoga treba izbjegavati istovremenu primjenu s ekspektoransima (lijekovi koji se koriste za lakše iskašljavanje sluzi kod produktivnog kašlja) jer to može dovesti do nakupljanja sluzi i povećanog rizika od bronhospazma (suženja bronha) i infekcije dišnog Sistema.

Uzimanje hrane i pića sa PANATUSOM FORTE

Tablete Panatusa forte progutajte (ili ih dajte djetetu) cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela.

Tokom liječenja Panatusom forte nemojte piti alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da dobijete dijete, pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije uzimanja ovog lijeka. Iako nema podataka o negativnim efektima, lijek se ne preporučuje u prva tri mjeseca trudnoće. Može se uzimati kasnije u trudnoći samo po savjetu ljekara. Takođe ne postoje adekvatni podaci o njegovom izlučivanju u majčino mlijeko; stoga se ne preporučuje njegova upotreba tokom dojenja.

Ako zatrudnite tokom liječenja Panatusom forte, razgovarajte sa svojim ljekarom.

Upravljanje vozilima i mašinama

Panatus može izazvati vrtoglavicu i pospanost. Savjetuje se oprez ako namjeravate voziti ili upravljati mašinama.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek PANATUS FORTE?

Panatus forte tablete sadrže laktozu. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, posavjetujte se s njime prije nego što uzmete ovaj lijek..

3. KAKO UZIMATI PANATUS FORTE?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Samoliječenje sa Panatusom forte je pogodno za odrasle i djecu stariju od 12 godina.

Uobičajena doza Panatusa forte za odrasle (i starije) je 1 tablete (50 mg) dva do tri puta dnevno.

Djeca i adolescenti

Uobičajena doza Panatusa forte za djecu stariju od 12 godina je 1 tableta (50 mg) jednom ili dva puta dnevno.

Tablete Panatusa forte progutajte cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela.

Nemojte prekoračiti preporučene doze kod samoliječenja sa Panatusom forte.

Samoliječenje sa Panatusom može trajati 5-7 dana. Razgovarajte sa svojim ljekarom, ako želite da koristite lijek ili da ga dajte djetetu duži period.

Ukoliko ste uzeli lijeka više nego što bi trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli (ili ste ga dali djetetu), odmah se posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom. Pokušajte izazvati povraćanje.

U slučaju predoziranja može doći do pospanosti, povraćanja, nekoordiniranih pokreta (ataksija), bolova u trbuhu, proljeva, uznemirenosti i ponešto sniženog krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus forte

Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Uzmite tablete (ili dajte djetetu) svaki dan u približno isto vrijeme. Ako zaboravite da uzmete tabletu, uzmite je čim se sjetite, ali ako imate samo nekoliko sati do sljedeće doze, preskočite propuštenu dozu i uzmite sljedeću u uobičajeno vreme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se ne moraju javiti kod svih pacijenata koji dobiju ovaj lijek.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 1000 osoba) uključuju osip na koži, urtikarija (koprivnjača) probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev), pospanost i vrtoglavicu.

Ni tokom dugotrajnog uzimanja nisu primijećene nuspojave na životne funkcije i rad drugih organa. Posebna prednost lijeka je izostanak nuspojava koje su značajne za opijatne antitusike.

Prijavljivanje sumnje na neželjna dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PANATUS FORTE?

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja koji je naveden na kutiji.

Čuvati na temperaturi do 25 °C. Čuvati u originalnom pakovanju kako biste osigurali zaštitu od vlage i svjetla.

Držati lijek van dohvaća i pogleda djece!

Rok trajanja Panatus forte filmom obložene tablete je 5 godina od datuma proizvodnje.

Panatus se ne smije koristiti poslije isteka roka trajanja lijeka u primjeni.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta PANATUS FORTE filmom obložene tablete 50 mg sadrže?

Aktivna supstanca: 1 filmom obložena tableta sadrži 50 mg butamirat-citrata.

Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, povidon, hipromeloza (E464), talk, magnezij-stearat (E572), koloidalni bezvodni silicij-dioksid u jezgri tablete, i hipromeloza (E464), titan-dioksid (E171), crveni željezo-oksidi (E172), talk i propilenglikol (E1520) u film oblozi.

Kako PANATUS FORTE filmom obložene tablete 50 mg izgledaju i sadržaj pakovanja?

Panatus forte filmom obložene tablete: okrugle, lagano bikonveksne tablete obložene crveno-smeđim filmom.

Kutija s 10 filmom obloženih tableta po 50 mg u blister pakovanju

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

PANATUS forte, filmom obložena tableta 10 x 50 mg: 04-07.3-2-12949/23 od 08.10.2024.

Datum posljednje revizije teksta

08.10.2024.