

1.3.1	Pantoprazole
SPC, Labeling and Package Leaflet	BA-Bosnia and Herzegovina

NOLPAZA 20 mg gastrotresistentna tableta
NOLPAZA 40 mg gastrotresistentna tableta
pantoprazol

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Nolzpa i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Nolzpu
3. Kako uzimati Nolzpu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Nolzpu?
6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE NOLPAZA I ZA ŠTA SE KORISTI?

Pantoprazol, aktivna supstanca u Nolzpa tabletama, je inhibitor protonske pumpe. Inhibitori protonske pumpe kao što je pantoprazol smanjuju količinu kiseline koja se stvara u Vašem želucu. Koristi se za liječenje bolesti želuca i crijeva uzrokovanih kiselinom.

Nolzpa tablete 20 mg uzimaju se za:

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji:

- Liječenje simptoma (npr. žgaravica, povrat kiseline, bol pri gutanju) povezanih s gastroezofagealnom refluksnom bolesti uzrokovanom povratom kiseline iz želuca.
- Dugoročno liječenje refluksnog ezofagitisa (upala jednjaka popraćena povratom želučane kiseline) i sprječavanje njezinog povrata.

Odrasli:

- Sprječavanje ulkusa (vrijedova) na dvanaesniku i želucu uzrokovanih dugotrajnim uzimanjem nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAIL, na primjer, ibuprofen) u rizičnih bolesnika koji trebaju neprekidno uzimati NSAIL (nesteroidne antiinflamatorne (protuupalne) lijekove).

Nolzpa tablete 40 mg uzimaju se za:

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji:

- Refluksni ezofagitis. Upalu jednjaka (cijevi koja povezuje grlo sa želucem) popraćenu povratom želučane kiseline.

Odrasli:

- Infekciju bakterijom nazvanom *Helicobacter pylori* u bolesnika s čirevima na dvanaesniku i želucu u kombinaciji s dva antibiotika (eradikacijska terapija). Cilj je riješiti se bakterija i time smanjiti vjerovatnoću povrata ovih čireva.
- liječenje ulkusa u želucu (vrijed/čir želuca) i ulkusa u početnom dijelu tankog crijeva (vrijed/čir dvanaesnika).
- Zollinger-Ellisonov sindrom i druga stanja u kojima se proizvodi previše kiseline u želucu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI NOLPAZU

Nemojte uzimati Nolzpu:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na pantoprazol ili na bilo koji drugi sastojak Nolzpe (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na lijekove koji sadrže druge inhibitore protonske pumpe.

1.3.1	Pantoprazole
SPC, Labeling and Package Leaflet	BA-Bosnia and Herzegovina

Budite oprezni sa Nolpazom

Prije uzimanja Nolpaze obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

- Ako imate teške probleme s jetrom. Molimo, obavijestite svog ljekara ako ste u prošlosti imali probleme s jetrom. Češće će Vam provjeravati enzime jetre, osobito pri uzimanju pantoprazola kao dugotrajne terapije. U slučaju povišenja jetrenih enzima, liječenje treba prekinuti.
- Ako kontinuirano trebate uzimati lijekove nazvane NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni (protuupalni) lijekovi) i uzimate pantoprazol jer imate povećan rizik od razvoja želučanih ili crijevnih komplikacija. Bilo koji povećani rizik procijenit će se prema Vašim osobnim faktorima rizika kao što su dob (65 godina ili stariji), istoriju čireva na želucu ili dvanaesniku ili krvarenje iz želuca ili crijeva.
- Ako imate smanjenje tjelesne zalihe ili faktore rizika za smanjenje vitamina B12 te primete pantoprazol kao dugotrajnu terapiju. Kao i sve supstance koje smanjuju kiselinu, pantoprazol može dovesti do smanjene apsorpcije vitamina B12.
- Upitajte svog ljekara za savjet ako istovremeno s pantoprazolom uzimate lijek koji sadrži atazanavir (za liječenje HIV-infekcije).
- Uzimanje inhibitora protonske pumpe poput pantoprazola, posebno tokom perioda dužeg od jedne godine, može malo povećati rizik od puknuća u kuku, zglobu ili kralježnici.
- Obavijestite svog ljekara ako imate osteoporozu (smanjenu gustoću kostiju) ili ako Vam je ljekar rekao da ste pod rizikom dobivanja osteoporoze (na primjer, ako uzimate steroide).
- Ako ste na Nolpazi duže od tri mjeseca moguće je da nivo magnezija padne. Nizak nivo magnezija može se posmatrati kao umor, nehotične kontrakcije mišića, dezorijentacija, kolvulzije, vrtoglavica, ubrzani rad srca. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah obavijestite svog ljekara. Niski nivoi magnezija također mogu dovesti do smanjenja nivoa kalijuma ili kalcijuma u krvi. Vaš ljekar može odlučiti da redovno obavlja krvne pretrage radi praćenja nivo magnezija.
- Ako ste ikada imali kožne reakcije nakon liječenja lijekom sličnim Nolpazi koji smanjuje želučanu kiselinu.
- Ako dobijete osip na koži, posebno na mjestima koja su izložena suncu, obavijestite svog ljekara što prije je moguće jer ćete možda trebati prekinuti liječenje Nolpazom. Ne zaboravite da spomenete i bilo koje druge štetne efekte poput bolova u zglobovima.
- ako treba da imate specifičnu analizu krvi (Hromogranin A)

Odmah obavijestite svog ljekara ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

- nenamjerni gubitak tjelesne težine
- povraćanje koje se ponavlja
- povraćanje krvi (to se može pojaviti kao tamna kava u povraćanju)
- ako primijetite krv u Vašoj stolici, koja po izgledu može biti crna ili tamna
- poteškoće u gutanju ili bol pri gutanju
- izgledate blijedo i osjećate se slabo (anemija)
- bol u prsima
- bolovi u stomaku
- težak i/ili učestao proljev jer je pantoprazol povezan s malim povećanjem infektivnih (zaraznih) proljeva.

Vaš ljekar će možda odlučiti da trebate obaviti pretrage kako bi isključili maligne bolesti jer pantoprazol također ublažava simptome karcinoma i može uzrokovati odgodu njegovog otkrivanja. Ako se Vaši simptomi nastave unatoč liječenju, razmotrit će se daljnje pretrage.

Ako dugotrajno uzimate pantoprazol (duže od 1 godine) ljekar će Vas vjerovatno pomno redovito pratiti. Prilikom svake posjete ljekaru trebate prijaviti sve nove te iznimne simptome i okolnosti.

Djeca i adolescenti

Ove tablete se ne preporučuju za upotrebu djeci mlađoj od 12 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa Nolpazom

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove.

Pantoprazol može uticati na djelotvornost drugih lijekova stoga obavijestite svog ljekara ako uzimate:

PI_Text067621_1	20.02.2024 - Updated: 20.02.2024	Page 2 of 7
-----------------	----------------------------------	-------------

1.3.1	Pantoprazole
SPC, Labeling and Package Leaflet	BA-Bosnia and Herzegovina

- Lijekove kao što su ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (koriste se za liječenje gljivičnih infekcija) ili erlotinib (koristi se za liječenje određenih vrsta karcinoma) jer pantoprazol može prekinuti ispravno djelovanje ovih i drugih lijekova.
- Varfarin i fenpropukumon, koji utiču na zgušnjavanje ili razrjeđivanje krvi. Možda ćete trebati obaviti dodatne pretrage.
- Lijekovi za liječenje HIV infekcije, kao što je atazanavir
- Metotreksat (liječak za liječenje reumatoidnoga artritisa, psorijaze i karcinoma) - ako uzimate metotreksat, vaš liječak može privremeno prekinuti liječenje Nolpazom jer pantoprazol može povećati nivo metotreksata u krvi
- Fluvoksamin (koristi se za liječenje depresije i drugih psihijatrijskih bolesti) - ako uzimate fluvoksamin vaš liječak može smanjiti dozu.
- Rifampicin (koristi se za liječenje infekcija).
- Kantarion (*Hypericum perforatum*) (koristi se za liječenje blage depresije).

Uzimanje hrane i pića zajedno sa Nolpazom

Uzmite tablete 1 sat prije obroka, nemojte ih žvakati ili lomiti te ih progutajte cijele s malo vode.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni li planirate imati dijete, pitajte svog ljekara ili ljekarnika za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.

Ne postoje odgovarajući podaci o primjeni pantoprazola u trudnica. Zabilježeno je izlučivanje u majčino mlijeko. Ako ste trudni ili mislite da ste trudni ili ako dojite, ovaj lijek smijete koristiti samo ako Vaš liječak smatra da korist za Vas premašuje mogući rizik za Vaše nerođeno dijete ili dojenče.

Upravljanje vozilima i mašinama

Nolpaza nema ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa mašinama.

Ako imate nuspojave poput omaglice ili zamagljenog vida, ne smijete upravljati vozilima ili mašinama.

Ostala upozorenja

Nolpaza tablete sadrže sorbitol. Ukoliko Vam je Vaš liječak rekao da ne podnosite određene šećere, upitajte ga za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

3.KAKO UZIMATI NOLPAZU?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš liječak. Provjerite sa svojim liječakom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Kada i kako uzimati lijek Nolpaza?

Uzmite tablete 1 sat prije obroka, nemojte ih žvakati ili lomiti te ih progutajte cijele s malo vode.

Ako liječak nije drugačije odredio, uobičajene doze su:

Nolpaza tablete 20 mg

Odrasli i adolescent u dobi od 12 godina i stariji:

Za liječenje simptoma (npr. žgaravica, povrat kiseline, bol pri gutanju) povezanih s gastroezofagealnom refluksnom bolesti

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Ova doza obično ublažava simptome unutar 2 - 4 sedmice - najkasnije nakon još 4 sedmice. Liječak će Vam reći koliko dugo trebate nastaviti uzimati lijek. Nakon toga, bilo kakvi opetovani simptomi mogu se, po potrebi, kontrolisati **uzimanjem jedne tablete dnevno**.

Za dugotrajno liječenje i sprječavanje povrata refluksnog ezofagitisa (upale jednjaka zbog povrata želučanog sadržaja)

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Ako se bolest vrati, liječak Vam može udvostručiti dozu; u tom slučaju možete uzeti jednu Nolpaza tabletu od 40 mg dnevno. Nakon izlječenja, dozu opet možete smanjiti na jednu tabletu od 20 mg dnevno.

Odrasli:

Za sprječavanje pojave čireva na dvanaesniku i želucu u bolesnika koji neprekidno moraju uzimati NSAID (nesteroidne protuupalne lijekove)

1.3.1	Pantoprazole
SPC, Labeling and Package Leaflet	BA-Bosnia and Herzegovina

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno.

Nolpaza tablete 40 mg

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji:

Za liječenje refluksnog ezofagitisa

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Ljekar Vam može povećati dozu na 2 tablete dnevno. Razdoblje liječenja refluksnog ezofagitisa obično traje između 4 i 8 tjedana. Ljekar će Vam reći koliko dugo trebate uzimati svoj lijek.

Odrasli:

Za liječenje infekcije bakterijom nazvanom *Helicobacter pylori* u bolesnika s čirevima na dvanaesniku i želucu, u kombinaciji s dva antibiotika (eradikacijska terapija)

Jedna tableta dva puta dnevno plus dvije tablete antibiotika amoksicilina, klaritromicina ili metronidazola (ili tinidazola), svaku trebate uzimati dva puta dnevno s Vašom tabletom pantoprazola. Prvu tabletu pantoprazola uzmite 1 sat prije doručka, a drugu tabletu pantoprazola 1 sat prije Vašeg večernjeg obroka. Slijedite upute svog ljekara te obavezno pročitajte upute o lijeku od ovih antibiotika. Uobičajeno razdoblje liječenja je jednu do dvije sedmice.

Uobičajne su sljedeće kombinacije koje se uzimaju dva puta na dan:

Nolpaza 40 mg + 500 mg klaritromicina + 1000 mg amoksicilina

Nolpaza 40 mg + 250-500 mg klaritromicina + 400-500 mg metronidazola (ili 500 mg tinidazola)

Nolpaza 40 mg + 400-500 mg metronidazola (ili 500 mg tinidazola) + 1000 mg amoksicilina

Uobičajno trajanje terapije je jedna do dvije sedmice.

Za liječenje čireva na želucu i dvanaesniku

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Nakon savjetovanja s Vašim ljekarom doza se može udvostučiti.

Ljekar će Vam reći koliko dugo trebate uzimati lijek. Razdoblje liječenja čireva na želucu obično traje između 4 i 8 sedmica. Razdoblje liječenja čireva na dvanaesniku (početnom dijelu tankog crijeva) obično traje između 2 i 4 sedmice.

Za dugotrajno liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja u kojima se proizvodi previše želučane kiseline

Preporučena početna doza obično iznosi dvije tablete dnevno.

Dvije tablete uzmite 1 sat prije obroka. Vaš ljekar kasnije može prilagoditi dozu, ovisno o količini proizvedene želučane kiseline. Ako su propisane više od dvije tablete dnevno, tablete je potrebno uzimati dva puta dnevno.

Ako Vaš ljekar propiše dnevnu dozu od više od četiri tablete dnevno, točno će Vam biti rečeno kada trebate prestati uzimati lijek.

Posebne skupine bolesnika:

- Ako imate problema s bubezima, umjerene ili teške probleme s jetrom, ne biste smjeli uzimati pantoprazol za eradikaciju (iskorijenjivanje) bakterije *Helicobacter pylori*.
- Ako imate teške probleme s jetrom, ne biste smjeli uzimati više od jedne tablete od 20 mg pantoprazola dnevno (u ovu svrhu dostupne su tablete koje sadrže 20 mg pantoprazola).

Djeca i adolescenti

Djeca mlađa od 12 godina.

Ove tablete ne preporučuju se za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što bi trebalo

Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Nisu poznati simptomi predoziranja.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek

Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Sljedeću normalnu dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Nolpazu

1.3.1	Pantoprazole
SPC, Labeling and Package Leaflet	BA-Bosnia and Herzegovina

Nemojte prekidati s uzimanjem ovih tableta bez prethodnog razgovora sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao svi lijekovi i lijek Nolpaza može imati nuspojave koje se ne pojavljuju kod svih bolesnika.

Ako Vam se pojavi bilo koja od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati ove tablete i odmah obavijestite svog ljekara ili se obratite odjelu za hitne slučajeve u najbližoj bolnici:

- **Teške alergijske reakcije (rjetka učestalost (mogu se javiti u do 1 na 1 000 ljudi)):** oticanje jezika i/ili grla, otežano gutanje, koprivnjača (ožarice), otežano disanje, alergijsko oticanje lica (Quinckeov edem / angioedem), jaka omaglica s vrlo brzim otkucajima srca i jakim znojenjem.
- **Teška stanja kože (učestalost nije poznata:** učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): stvaranje plikova po koži i brzo pogoršanje Vašeg opšteg stanja, erozije (oštećenja) (uključujući lagano krvarenje) očiju, nosa, usta/usana ili genitalija, ili osjetljivost kože/osip, osobito na dijelovima kože izloženim svjetlu/suncu.
- Također možete imati bolove u zglobovima ili simptome slične gripi, vrućicu, otečene žlijezde (npr. u pazuhu), a krvne pretrage mogu pokazati promjene u određenim bijelim krvnim stanicama ili jetrenim enzimima (Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom, Erythema multiforme, Subakutni kožni eritematozni lupus, reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), fotoosjetljivost).
- **Druga teška stanja (učestalost nije poznata:** učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): žutilo kože ili bjeloočnica oka (teško oštećenje stanica jetre, žutica) ili vrućica, osip te ponekad povećani bubrezi uz bolno mokrenje i bol u donjem dijelu leđa (teška upala bubrega), moguće napreduje do zatajenja bubrega.

Druge nuspojave su:

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 ljudi)

Benigni polipi u želucu

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Glavobolja; omaglica; proljev; osjećaj mučnine, povraćanje; nadutost ili flatulencije (vjetrovi); zatvor; suhoća usta; bol i nelagoda u trbuhu; kožni osip, egzantem (plikovi po koži), izbijanje kožnih promjena; svrbež; prelom kuka, zglobova ili kičme; osjećaj slabosti, iscrpljenosti ili opšta slabost; poremećaji spavanja.

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Poremećaji vida kao što su zamagljen vid; poremećaj ili potpuni nestanak osjeta okusa, koprivnjača; bol u zglobovima; bolovi u mišićima; promjene tjelesne težine; povišena tjelesna temperatura; oticanje udova (periferni edem); alergijske reakcije; depresija; povećanje grudi u muškaraca.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

Dezorijentacija.

Nije poznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Halucinacije, zbunjenost (osobito u bolesnika s istorijom ovih simptoma); osjećaj bockanja, bridenja, peckanja ili utrnulosti; upala u debelom crijevu koja izaziva trajni vodeni proliv; osip, po mogućnosti sa bolovima u zglobovima

Nuspojave identificirane pretragama krvi:

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Povećanje jetrenih enzima.

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Povišena razina bilirubina; povećanje količine masnoća u krvi; naglo smanjenje broja granulocita - vrste bijelih krvnih stanica.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

Smanjenje broja krvnih pločica, koje može prouzročiti krvarenje ili stvaranje modrica više nego je uobičajeno; smanjenje broja bijelih krvnih stanica koje može dovesti do češćih infekcija; paralelno abnormalno smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih stanica, kao i trombocita.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz postojećih podataka)

1.3.1	Pantoprazole
SPC, Labeling and Package Leaflet	BA-Bosnia and Herzegovina

Snižena razina natrija, magnezija, kalcija ili kalija u krvi (vidjeti dio 2).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI NOLPAZU?

Lijek morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvajte na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

Rok trajanja lijeka je 5 godine od datuma proizvodnje.

Nolpaza se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Nolpaza sadrži?

Nolpaza gastorezistentna tableta 20 mg

Aktivna supstanca: 1 gastorezistentna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazolnatrij seskvihidrata).

Pomoćne supstance: manitol, kros повідon, natrijev karbonat, sorbitol, kalcijev stearat, hipromeloza, повідon, titanijev dioksid (E171), željezov oksid žuti (E172), propilenglikol, metakrilatna kiselina - etilakrilat kopolimer (1:1) 30-postotna raspršina, natrijev laurilsulfat, polisorbitat 80, makrogol 6000, talk

Nolpaza gastorezistentna tableta 40 mg

Aktivna supstanca: 1 gastorezistentna tableta sadrži 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazolnatrij seskvihidrata).

Pomoćne supstance: manitol, kros повідon, natrijev karbonat, sorbitol, kalcijev stearat, hipromeloza, повідon, titanijev dioksid (E171), željezov oksid žuti (E172), propilenglikol, metakrilatna kiselina - etilakrilat kopolimer (1:1) 30-postotna raspršina, natrijev laurilsulfat, polisorbitat 80, makrogol 6000, talk

Kako Nolpaza izgleda i sadržaj pakovanja?

Nolpaza gastorezistentne tablete 20 mg dostupne su u blisterima po 14 ili 15 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 14, 28 ili 30 tableta.

Nolpaza gastorezistentne tablete 40 mg dostupne su u blisterima po 14 ili 15 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 14, 28 ili 30 tableta.

Gastorezistentne tablete od 20 mg i od 40 mg su svijetložute-smeđe boje, ovalne, lagano obostrano izbočene.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz lječarski recept.

Naziv i adresa proizvođača

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka

Nolpaza gastorezistentna tableta 20 mg:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Nolpaza gastorezistentna tableta 40 mg:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

KRKA FARMA d.o.o., Sarajevo

Džemala Bijedića 125A, Sarajevo

1.3.1	Pantoprazole
SPC, Labeling and Package Leaflet	BA-Bosnia and Herzegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 14 x 20 mg: 04-07.3-2-12612/19 od 27.08.2020.
Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 28 x 20 mg: 04-07.3-2-12613/19 od 27.08.2020.
Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 30 x 20 mg: 04-07.3-2-12614/19 od 27.08.2020.
Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 14 x 40 mg: 04-07.3-2-12609/19 od 27.08.2020.
Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 28 x 40 mg: 04-07.3-2-12610/19 od 27.08.2020.
Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 30 x 40 mg: 04-07.3-2-12611/19 od 27.08.2020.